

MEDICINA DI LABORATORIO

GALLARATE (VA) Via Vespucci, 24 - Tel. 0331 797529
E-mail: analisi@cedal.net

MILANO (MI) Piazzale Istria, 3 - Tel. 02 6072709
E-mail: analisi.milano@cedal.net



MOD.5/LAB./rev.2019

MODALITA' DI RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE PER L'ESECUZIONE DELLO SPERMIOTECNICO

Per una corretta esecuzione dell'esame è necessario mantenere un periodo di astinenza di almeno 3 giorni.

Il liquido seminale deve essere raccolto preferibilmente presso la nostra sede, in un contenitore sterile fornito dal Laboratorio.

Nel caso di raccolta a domicilio il liquido seminale deve essere consegnato in Laboratorio nel più breve tempo possibile avendo l'avvertenza di tenerlo ad una temperatura di 37°C; in questo caso però alcune prove non possono essere eseguite.

La raccolta del materiale deve essere effettuata seguendo questo procedimento:

- lavare accuratamente la regione genitale. Nel caso in cui vengano usate creme che possono alterare la motilità degli spermatozoi e quindi diminuire la loro capacità fecondante, si consiglia di consultare il medico prima dell'esecuzione dell'esame
- raccogliere il liquido seminale tramite masturbazione
- raccogliere l'intero campione di ejaculato. Se la raccolta risultasse incompleta, si prega di segnalarlo
- chiudere accuratamente il contenitore e segnalarne l'ora di raccolta sul foglio di rilevazione dati del paziente

Nota:

- l'esame viene eseguito su appuntamento
- l'esecuzione dell'esame colturale per la ricerca di batteri, clamidia, micoplasma ecc. deve essere espressamente richiesta dal medico prescrittore.

>>>

METHOD OF COLLECTING THE SEMINAL LIQUID FOR THE EXECUTION OF THE SPERMATOGRAM

For a correct execution of the exam it is necessary to maintain an abstinence period of at least 3 days. The seminal fluid should preferably be collected at our site, in a sterile container provided by the laboratory.

In the case of home collection the seminal fluid must be delivered to the laboratory as soon as possible having the warning to keep it at a temperature of 37 ° C; in this case, however, some tests can not be performed.

The collection of the material must be carried out following this procedure:

- Thoroughly wash the genital region. In the event that creams are used that can alter the motility of the sperm and therefore decrease their fertilizing capacity, it is advisable to consult the doctor before the examination.
- collect the seminal fluid by masturbation
- collect the entire ejaculate sample. If the collection is incomplete, please report it
- carefully close the container and report its collection time on the patient's data sheet

note:

- the examination is executed on appointment.
- the executions of the coldural examination for the research of bacteria, clamidia,micoplasma ecc. must be expressly requested by the doctor prescriber

>>>

PROCÉDÉ DE COLLECTE DU LIQUIDE SEMINAIRE POUR L'EXÉCUTION DU SPERMIOTOCITOGRAAMME

Pour une exécution correcte de l'examen, il est nécessaire de maintenir une période d'abstinence d'au moins 3 jours.

Le liquide séminal doit de préférence être prélevé sur notre site, dans un récipient stérile fourni par le laboratoire.

Dans le cas de la collecte à domicile, le liquide séminal doit être livré au laboratoire dès que possible, en ayant l'avertissement de le maintenir à une température de 37 ° C; dans ce cas, cependant, certains tests ne peuvent pas être effectués.

La collecte du matériel doit être effectuée selon cette procédure:

- a) Bien laver la région génitale. Dans le cas où des crèmes sont utilisées qui peuvent altérer la motilité du sperme et donc diminuer leur capacité fécondante, il est conseillé de consulter le médecin avant l'examen.
- b) recueillir le liquide séminal par la masturbation;
- c) recueillir l'échantillon entier d'éjaculat. Si la collection est incomplète, veuillez le signaler
- d) fermer soigneusement le récipient et rapporter son heure de prélèvement sur la fiche de données du patient

notes:

- l'examen est effectué sur rendez-vous.
- l'exécution du test de culture pour la détection des bactéries, de la chlamydia, mycoplasme etc. doit être spécifiquement demandé par le prescripteur

>>>

طريقه جمع السائل السemen من أجل تنفيذ سببى رميوسى توغرام

للتتنفيذ الصحيح للامتحان فمن الضروري لاحفاظ على فترة الامتناع عن ممارسة 3 أيام على الأقل. ويفضل أن يتم جمع السائل المنوي في موقع، في حاوية معقمة التي يقادها المختبر.

لمن وي إلى المختبر في أقرب وقت ممكن وعند تحذير لابقاءه عند درجة حرارة 37 درجة جمع المنزل يجب تسليم السائل درجة مئوية. في هذه الحالة، ومع ذلك، لا يمكن إجراء بعض الاختبارات.

يجب أن يتم جمع المواد بعد هذا الإجراء: أ) غسل تماما في المنطقه التناسلية. في حالة استخدام الكريمات التي يمكن أن تغير حرکية الحيوانات المنوية وبالاتالي تقليل قدرتها التسمية، فإن من المستحسن استشارة الطبيب قبل الفحص.

ب) جمع السائل المنوي عن طريق الاستمناء.

موعة غير مكتملة، يرجى الإبلاغ عن ها (جمع عينة الـقذف بالكمبل). إذا كانت المخدرات إغلاق الاحواية بعنایة والإبلاغ عن الوقت جمعاً على ورقة بيانية المريض

الملاحظات:

- يتم إجراء الامتحان عن طريق التعيين.
- تنفيذ اختبار الشفافية للكشف عن البكتيريا، الكلاميديا، فعلى وجه التحديد الميكوبلازميا وما إلى ذلك. يجب أن يطلبوا الواسع