



MOD.9/LAB./rev.2019

MODALITÀ DI RACCOLTA FECI PER RICERCA PARASSITI

RICERCA PARASSITI E LORO UOVA

Il campione da esaminare deve essere consegnato al massimo entro 2-3 ore dall'emissione in apposito contenitore fornito dal Laboratorio.

Per eseguire correttamente l'esame è necessaria una quantità di feci pari a una noce.

ESECUZIONE SCOTCH TEST

Per la ricerca degli ossiuri oltre ad un campione di feci è necessario eseguire uno "Scotch Test".

L'esame va eseguito la mattina prima di alzarsi dal letto (non devono essere usate creme o medicinali la sera precedente). Appoggiare la parte adesiva di un pezzo di scotch trasparente (lungo circa 7 cm) all'ano, facendolo aderire molto bene. Lasciarlo appoggiato per circa 10 minuti rimanendo sempre sdraiati. Trascorso questo tempo staccare lo scotch e attaccarlo sul vetrino, fornito dal Laboratorio, tenendolo ben teso in modo da non far creare pieghe sulla sua superficie, quindi consegnarlo.

>>>>>>>>>

SEARCH PARASITES AND THEIR EGGS

The test sample must be delivered to the Laboratory no later than 2-3 hours after 'issue.

To properly perform the examination it is necessary a quantity of feces amounts to a walnut.

SCOTCH -TEST

For the detection of pinworms, as well as a stool sample, you must run a "Scotch Test."

The examination should be performed in the morning before getting out of bed (should not be used creams or medicines the night before). Place the sticky side of a piece of transparent tape (about 7 cm long) on the anus, sticking it very well. Leave it resting for about 10 minutes, remaining lying down. After this time, remove the tape and stick it on the slide, provided by the Laboratory, holding it taut not to create creases on its surface and give it in the laboratory.

>>>

RECHERCHE PARASITES ET LEURS OEUFs

L'échantillon d'essai doit être livré au Laboratoire au plus tard 2-3 heures après l'émission.

Pour effectuer correctement l'examen, vous avez besoin d'une quantité de matières fécales équivalent à une noix.

SCOTCH TEST DE PERFORMANCE

Pour la détection des oxyures en plus d'un échantillon de selles, vous devez exécuter un "Test Scotch."

L'examen doit être effectué le matin avant de sortir duit (ne doit pas être utilisé crèmes ou médicaments la veille). Placez le côté collant d'un morceau de ruban adhésif transparent (environ 7 cm de long) de l'anus, ce qui en fait bien adhérer. Laissez-le reposer pendant environ 10 minutes tout en restant couché. Après ce temps, retirez la bande et le collez sur la diapositive, fourni par le Laboratoire, en le tenant tendu afin de ne pas créer de plissur sa surface et lui donner dans le laboratoire.

>>>

اغس و باراسي تيس ال ابحوث

يقدمها التي خاصة حاوية في الانبعاثات من ساعات 2-3 غرضون في فحصها سيتم التي العينة تسليم يتم أن يجب المخببر.

واحد الجوز يساوي البراز نم لكمية مطلوب صرحي، بشكل الاختبار لإجراء.

سكوتش اختبار إكسكوتشن

"سكوتش اختبار" لأداء الضروري فمن البراز عينة إلى بالإضافة الدبوسية عن للبحث.

(السابقة الليلة في تستخدم ألا يجب الأدوية أو الكريجات) السرير من الخروج من الصباح قبل الاختبار يتم أن يجب جيد بشكل تلتزم يجعها مما الشرح، فتحة إلى (طويلة سم 7 حوالي) شفافة سكوتش من قطعة من اللاصق الجزء وضع الشريحة، على بها والتمسك الشريط إزالة الوقت هذا بعد. الاستلقاء تبقى حين في دقائق 10 لمدة يستريح تركه. للغاية تسليمه ثم طحه، على التراجع يخلق لا حتى مشدود عليها والحفاظ المخببر، يقدمها التي.